PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA CEIEGT-FMVZ-UNAM

MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE BOVINOS DE DOBLE PROPÓSITO

Módulo de Producción de Bovinos De Doble Propósito												
CRIANZA												
ACTIVIDAD	**ENE**	**FEB**	**MZO**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
Desinfección de ombligo	X				X	X	X				X	X
Peso al nacimiento	X				X	X	X				X	X
Identificación					X	X	X					
Descorne y marcado		X	X	X				X	X	X		
Vacunación contra rabia		X	X	X				X	X	X		
Aplicación de bacterina triple (*Clostridium chauvei*, *P*asteurella multocida A y D, *Mannheimia haemolytica*)		X	X					X	X			
Pesaje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muestreo de heces y desparasitación interna	Se realiza un muestreo mensual para y simultáneamente, la desparasitación selectiva de los animales. Los animales son desparasitados cuando la eliminación de huevos por gramo de heces (ehpgh) es ≥ 800. Los animales son tratados contra coccidias cuando sale positiva la prueba.											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diagnóstico de ectoparásitos (moscas y garrapata) y baño garrapaticida/mosquicida	Simultáneo muestreo mensual de heces y/o pesaje, se realiza la inspección individual de todos los animales; y se realiza el baño correspondiente cuando el conteo de moscas o garrapata asciende a ≥ 25 parásitos en un flanco del animal.											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Módulo de Producción de Bovinos De Doble Propósito												
REEMPLAZO Y DESTETE												
ACTIVIDAD	**ENE**	**FEB**	**MZO**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
Destete	X				X	X	X				X	X
Vacunación contra rabia					X							
Aplicación de bacterina triple (*Clostridium chauvei*, *P*asteurella multocida A y D, *Mannheimia haemolytica*)			X	X	X							
Pesaje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muestreo de heces y desparasitación interna	Se realiza un muestreo mensual para y simultáneamente, la desparasitación selectiva de los animales. Los animales son desparasitados cuando la eliminación de huevos por gramo de heces (ehpgh) es ≥ 800. Los animales son tratados contra coccidias cuando sale positiva la prueba.											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diagnóstico de ectoparásitos (moscas y garrapata) y baño garrapaticida/mosquicida	Simultáneo muestreo mensual de heces y/o pesaje, se realiza la inspección individual de todos los animales; y se realiza el baño correspondiente cuando el conteo de moscas o garrapata asciende a ≥ 25 parásitos en un flanco del animal.											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diagnóstico de Brucela y TB			X									

Módulo de producción de Bovinos De Doble Propósito												
VACAS LACTANDO Y SECAS												
ACTIVIDAD	**ENE**	**FEB**	**MZO**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
Aplicación bacterina triple (*Clostridium chauvei*, *P*asteurella multocida A y D, *Mannheimia haemolytica*)				X								
Aplicación Vit. ADE preparto				X						X		
Vacunación contra rabia					X							
Desparasitación vacas secas	AL SECADO											
Desparasitación recién paridas	X				X	X	X				X	X
Baño garrapaticida							X		X			
Baño mosquicida			X			X			X	X		
Detección y tratamiento mastitis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pesaje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diagnóstico de Brucela y TB			X									

MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE VAQUILLAS F1

Módulo de producción de Vaquillas F1												
GANADO ADULTO Y CRÍAS												
ACTIVIDAD	**ENE**	**FEB**	**MZO**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
Bacterina triple (adultos) (*Clostridium chauvei*, *P*asteurella multocida A y D, *Mannheimia haemolytica*)			X	X	X							
Bacterina triple (Crías de 3 meses) (*Clostridium chauvei*, *P*asteurella multocida A y D, *Mannheimia haemolytica*)					X	X	X	X		X		
Vacunación contra rabia (adultos)					X							
Vacunación contra rabia (Crías de 3 meses)					X	X	X	X				
Muestreo de heces y Desparasitación	Se realiza un muestreo mensual para y simultáneamente, la desparasitación selectiva de los animales. Los animales son desparasitados cuando la eliminación de huevos por gramo de heces (ehpgh) es ≥ 800											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diagnóstico de ectoparásitos (moscas y garrapata) y desparasitación	Simultáneo muestreo mensual de heces y/o pesaje, se realiza la inspección individual de todos los animales; y se realiza el baño correspondiente cuando el conteo de moscas o garrapata asciende a ≥ 25 parásitos en un flanco del animal.											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diagnóstico de Brucela y TB			X									

MÓDULO DE PRODUCCIÓN OVINA

Módulo de Producción Ovina												
CRIANZA Y ADULTOS												
ACTIVIDAD	**ENE**	**FEB**	**MZO**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
Desinfección de ombligo	X	X	X	X								
Peso al nacimiento	X	X	X	X								
Identificación	X	X	X	X								
Destete				X		X						
Vacunación *Mannheimia haemolytica*										X		
Vacunación Enterotoxemia (Crias)	X	X	X	X	X							X
Vacunación Enterotoxemia (Adultos)		X										X
Pesaje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muestreo de heces y desparasitación interna	Se realiza un muestreo mensual para y simultáneamente, la desparasitación selectiva de los animales. Los animales son desparasitados cuando la eliminación de huevos por gramo de heces (ehpgh) es ≥ 800 y tienen un grado FAMACHA ≥3. Los animales son tratados contra coccidias cuando sale positiva la prueba.											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diagnóstico de ectoparásitos (moscas y garrapata) y baño garrapaticida/mosquicida	Simultáneo muestreo mensual de heces y/o pesaje, se realiza la inspección individual de todos los animales; y se realiza el baño correspondiente cuando hay lesiones sugestivas de sarna.											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

MÓDULO DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA

Módulo de Producción Acuícola												
ENGORDA, CRÍA Y REPRODUCTORES												
ACTIVIDAD	**ENE**	**FEB**	**MZO**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
Gyrodactilosis	Se realiza un muestreo mensual en cada tina y estanque de producción. Los tanques son tratados cuando la infestación es ≥ 10 gyrodactylus spp., por pez.											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trichodinosis	Se realiza un muestreo mensual en cada tina y estanque de producción. Los tanques son tratados cuando la infestación es positiva.											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Saprolegniosis	Se aplica cuando se hace un manejo zootécnico (cosecha, pesaje y/o movilización de animales), sobre todo en temporada invernal. No obstante, se realiza un muestreo mensual en cada tina y estanque de producción, mismos que son tratados cuando la infestación es positiva.											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X